

Digital Repository Universitas Jember
e-Journal

PustakaKesehatan

Volume 3 Nomor 2, Mei 2015



Digital Repository Universitas Jember

Artikel Ilmiah pada jurnal on-line tidak terakreditasi


e-Jurnal Pustaka Kesehatan, vol. 3 (no. 2), Mei 2015

ISSN :2355-178X

Judul:

**Jumlah Fibroblas pada Luka Bakar Derajat II pada Tikus dengan
Pemberian Gel Ekstrak Etanol Biji Kakao dan Silver Sulfadiazine**

*(The Total Fibroblast on the Second Degree Burns of Rats after Treatment
using Ethanolic Extract of Cocoa Beans)*



Muhammad Izat Fuadi

Ulfa Elfiah

Misnawi

Fakultas Kedokteran Universitas Jember

2018



[Skip to main content](#) [Skip to main navigation menu](#) [Skip to site footer](#)





Digital Repository Universitas Jember

- [Current](#)
- [Archives](#)
- [About](#)
 - [About the Journal](#)
 - [Editorial Team](#)
 - [Submissions](#)
 - [Contact](#)



[Search](#)

- [Register](#)
- [Login](#)

1. [Home /](#)
2. [Archives /](#)

3.Vol 3 No 2 (2015)

Published: 2016-03-18

Articles

- [Daya Hambat Ekstrak Daun Pepaya \(*Carica papaya L.*\) terhadap Adhesi Bakteri *Porphyromonas gingivalis* pada Neutrofil \(Inhibition of Papaya \(*Carica papaya L.*\) Leaves Extract on Adhesion of *Porphyromonas gingivalis* Bacteria to Neutrophils\)](#)

Ermita Windya Pratiwi, Depi Praharani, Yuliana Mahdiyah Da'at Arina
193-198
 - [PDF](#)
- [Daya Inhibisi Korosi Ekstrak Daun Belimbing Wuluh \(*Averrhoa bilimbi L.*\) terhadap Kawat Thermal NiTi Ortodonti \(Corrosion Inhibition of Starfruit Leaves Extract \(*Averrhoa bilimbi L.*\) on Thermal NiTi Orthodontic Wire\)](#)

Irdian Devi Saputri, Rudy Joelijanto, Leliana Sandra Devi Ade Putri Putri
199-204
 - [PDF](#)
- [Kadar Serum Glutamat Piruvat Transaminase \(SGPT\) pada Tikus Wistar \(*Rattus norvegicus*\) Jantan yang Dipapar Stresor Rasa Sakit berupa Electrical Foot Shock selama 28 Hari \(The Level of Serum Glutamic Pyruvic Transaminase \[SGPT\] on a Wistar \[*Rattus norvegicus*\]](#)

Hesty Kumala Sari, Roedy Budirahardjo, Erna Sulistyani
205-211
 - [PDF](#)

Digital Repository Universitas Jember

- Pengaruh Daun Katuk (*Sauvopus androgynus* (L.) Merr.) terhadap Waktu Perdarahan (Bleeding Time) pada Tikus Wistar Jantan sebagai Alternatif Obat Antitrombotik (The Effect of Star Gosseberry (*Sauvopus androgynus* (L.) Merr.) to bleeding time of Male Wistar)

Selvia Magdalena, Budi Yuwono, Agustin Wulan Suci Dharmayanti

212-216

○ [PDF](#)

- Deteksi Lesi Aterosklerosis Koroner pada Model Tikus Periodontitis (Detection of Coronary Atherosclerotic Lesions in Periodontitis Rat Model)

Roza Nafilah, Rendra Chriestedy Prasetya, I Dewa Ayu Susilawati

217-223

○ [PDF](#)

- Uji Klinis Penggunaan Pasta Gigi Herbal Terhadap Penurunan Indeks Plak Rongga Mulut (Clinical Trial of Herbal Toothpaste to Reduce Plaque Index in Oral Cavity)

Danang Dewantara Ananda Putra, Pudji Astuti, Abdul Rochim

224-229

○ [PDF](#)

- Uji Toksisitas Akut Ekstrak Buah *Bruguiera gymnorhiza* pada Tikus (*Rattus norvegicus*) (Acute Toxicity Test of *Bruguiera gymnorhiza* Fruit Extract In Rats (*Rattus norvegicus*))

Salman Al Farisi, Al Munawir, Zahrah Febianti

230-234

○ [PDF](#)

- Efek Ekstrak Etanol Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii*) terhadap Kadar MDA Ginjal pada Tikus Wistar Hiperglikemi (The Effect of Cinnamon (*Cinnamomum burmannii*) Ethanolic Extract on Kidney MDA in Hyperglycemic Wistar Rats)

Vidya Muqsita, Elly Nurus Sakinah, Ali Santosa

235-238

○ [PDF](#)

- Efek Ekstrak Air Kulit Buah Delima (*Punica granatum L*) terhadap *Salmonella typhimurium* secara In Vivo (The Effect of Pomegranate (*Punica granatum L*) Peel Aqueous Extract on *Salmonella typhimurium* In Vivo)

Anastasia Citra Purwani, Dini Agustina, Yuli Hermansyah

239-243

○ [PDF](#)

- Jumlah Fibroblas pada Luka Bakar Derajat II pada Tikus dengan Pemberian Gel Ekstrak Etanol Biji Kakao dan Silver Sulfadiazine (The Total Fibroblast on the Second Degree Burns of Rats after Treatment using Ethanolic Extract of Cocoa Beans)

Muhammad Izat Fuadi, Ulfa Elfiah, Misnawi Misnawi

Digital Repository Universitas Jember

244-248

- [PDF](#)
- [Pengaruh Minuman Kopi terhadap VO2max dan Pemulihan Denyut Nadi pasca Melakukan Treadmill \(The Influence of a Coffee Drinks to VO2max and Pulse Recovery after Doing Treadmill\)](#)

Natasha Amelia, Cholis Abrori, M Ihwan Narwanto

249-252

- [PDF](#)
- [Hubungan antara Obesitas dengan Derajat Nyeri pada Penderita Osteoarthritis Lutut di RS Bina Sehat Jember \(Relationship between Obesity and Degree of Pain in Knee Osteoarthritis Patients at Bina Sehat Hospital, Jember\)](#)

Rizka Kusumaningsih, Muhammad Hasan, Irawan Fajar Kusuma

253-256

- [PDF](#)
- [Optimasi Komposisi Pelarut Gliserin dan Propilen Glikol terhadap Disolusi Tablet Meloksikam Metode Likuisolid Menggunakan Simplex Lattice Design \(Optimization Composition of Glycerin and Propylene Glycol Solvent on Dissolution of Meloxicam Tablet with Li\)](#)

Yudistirawati Khusna, Eka Deddy Irawan, Lusia Oktora Ruma Kumala Sari

257-261

- [PDF](#)
- [Studi Penggunaan Antibiotik pada Pasien Penyakit ISPA Usia Bawah Lima Tahun di Instalasi Rawat Jalan Puskesmas Sumbersari Periode 1 Januari-31 Maret 2014 \(Study of Antibiotics Use on ARI Patients in Under Five Years Outpatient Clinic, Sumbersari Health\)](#)

Tika Sugiarti, Arya Sidemen, Wiratmo Wiratmo

262-266

- [PDF](#)
- [Uji Aktivitas Antibakteri dan Antibiofilm Minyak Atsiri Rimpang Bengle \(*Zingiber purpureum* Roscoe\) terhadap Bakteri *Staphylococcus epidermidis* \(Antibacterial and Antibiofilm Activity Test of Bengle Rhizome Essential Oil \(*Zingiber purpureum* Roscoe\) against](#)

Hidayatul Ulyah, Evi Umayah Ulfa, Endah Puspitasari

267-271

- [PDF](#)
- [Uji Antifertilitas Kombinasi Fraksi Kloroform Biji Pepaya \(*Carica papaya* Linn.\) dengan Fraksi Metanol Biji Saga \(*Abrus precatorius* Linn.\) terhadap Spermatogenesis Tikus Jantan Galur Wistar \(Antifertility Study from Combination of Chloroform Fractions o](#)

Zainah Rajab, Siti Muslichah, Fifteen Aprila Fajrin

Digital Repository Universitas Jember

272-277

- [PDF](#)
- [Deteksi Gelatin Babi pada Sampel Permen Lunak Jelly Menggunakan Metode Fourier Transform Infra Red \(FTIR\) dan Kemometrik \(Detection of Porcine Gelatin in Jelly Soft Candy Sample Using Fourier Transform Infra Red and Chemometrics\)](#)

Annisa Rahmawati, Bambang Kuswandi, Yuni Retnaningtyas

278-283

- [PDF](#)
- [Penetapan Kadar Inulin dalam Ekstrak Umbi Dahlia variabilis dan Dahlia pinnata dengan Metode KLT Densitometri \(Determination of Inulin Content in Dahlia variabilis and Dahlia pinnata Tuber Extract by TLC Densitometry Method\)](#)

Khoirun Nisa', Yuni Retnaningtyas, Nia Kristiningrum

284-288

- [PDF](#)
- [Pengaruh Terapi Suportif: Kelompok terhadap Perubahan Harga Diri Klien TB Paru di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember \(The Influence of Group Supportive Therapy for Change of Self-Esteem Client Pulmonary TB in the District Umbulsari Jember\)](#)

Bafidz Arifahmi Bachtiyar, Erti Ikhtiarini Dewi, Latifa Aini Susumaningrum

289 - 294

- [PDF](#)
- [Pengaruh Terapi Bermain SCL \(Snake, Cards, and Ladders\) terhadap Keterampilan Mencuci Tangan Siswa Kelas I dan II di SDN Pakusari II Kabupaten Jember \(The Effect of SCL \(Snake, Cards, and Ladders\) Games Therapy to Hand Washing Skill of First and Second G](#)

Nurul Azizah, Tantut Susanto, Latifa Aini Susumaningrum

295 - 302

- [PDF](#)
- [Pengaruh Pelatihan Perawatan Tali Pusat dengan Metode Simulasi terhadap Keterampilan Merawat Tali Pusat pada Ibu Primigravida Trimester II-III di Wilayah Kerja Puskesmas Ledokombo Kabupaten Jember \(The Influence of Umbilical Cord Care Training \(UCCT\) by S](#)

Rosalind Prihandini, Ratna Sari Hardiani, Rondhianto Rondhianto

303 - 310

- [PDF](#)
- [Pengaruh Progressive Muscle Relaxation terhadap Aliran Puncak Ekspirasi Klien dengan Asma Bronkial di Poli Spesialis Paru B Rumah Sakit Paru Kabupaten Jember \(The Effect of Progressive Muscle Relaxation on Peak Expiratory Flow of Clients with Bronchial As](#)

Christina Novarin, Murtaqib Murtaqib, Nur Widayati

311 - 318

Digital Repository Universitas Jember

- [PDF](#)
- [Pengaruh Perencanaan Diet Diabetes Mellitus dengan Model Self Care terhadap Diet Self Care Behavior dan Kolesterol Total pada Klien dengan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Rambipuji Kabupaten Jember \(The Influence of Diet Planning Diabe](#)

Gigih Permana Kusuma Putra, Rondhianto Rondhianto, Dodi Wijaya

319 - 326

- [PDF](#)
- [Hubungan Bonding Attachment dengan Resiko Terjadinya Postpartum Blues pada Ibu Postpartum dengan Sectio Caesaria di Rumah Sakit Ibu dan Anak \(RSIA\) Srikandi IBI Kabupaten Jember \(The Correlation between Bonding Attachmentand The Risk of Happen of Postpar](#)

Dian Charla Yodatama, Ratna Sari Hardiani, Lantin Sulistyorini

327 - 333

- [PDF](#)
- [Perancangan Sistem Informasi Klaim Persalinan Studi Kasus di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Jember \(Design of Delivery Claims Information System Case Study on Health Social Security Administering Bodies of Jember Branch Office\)](#)

Dwi Prasetyo Utomo, Andrei Ramani, Yunus Ariyanto

341-348

- [PDF](#)
- [Determinan Kejadian Stunting pada Anak Balita Usia 12-36 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Randuagung Kabupaten Lumajang \(Determinants of Stunting among Children Aged 12-36 Months in Community Health Center of Randuagung, Lumajang Distric\)](#)

Dicka Indo Putri Priyono, Sulistiyanu Sulistiyanu, Leersia Yusi Ratnawati

349-355

- [PDF](#)
- [Pemanfaatan Eceng Gondok Terhadap Penurunan Kadar Merkuri \(Hg\) Limbah Cair Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin \(PETI\) The Use of Eichornia Crassipes to Reduce Mercury \(Hg\) Levels on Liquid Waste in Illegal Gold Mines](#)

Shelga Sapta Lahenda, Ellyke Ellyke, Khoiron Khoiron

356-361

- [PDF](#)
- [Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingginya Angka Open Defecation \(OD\) di Kabupaten Jember \(Studi di Desa Sumber Kalong Kecamatan Kalisat\) Factors Assosiated with High Number of Open Defecation \(OD\) in District Jember \(Studies in Sumber Kalong Village\)](#)

Wahyu Afiatul Qudsiyah, Rahayu Sri Pujiati, Prehatin Trirahayu Ningrum

362-369

Digital Repository Universitas Jember

- [PDF](#)
- [Pengaruh Pemutaran Film “Waspada Banjir Bandang” Terhadap Mitigasi Bencana Banjir Bandang \(The Influence of Film Playback “Flash Flood Wary” toward Mitigation Flash Flood Disaster\)](#)

Erna Desi Faradinah, Dewi Rokhmah, Mury Ririanty

370-374

- [PDF](#)
- [Peran Dukun dalam Implementasi Kemitraan Bidan dan Dukun di Wilayah Kerja Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember \(The Role of Traditional Birth Attendance in the Implementation of Partnership between Midwife and Traditional Birth Attendance at Bangsalsari\)](#)

Devy Aristin S. Sofyan, Abu Khoiri, Eri Witcahyo


334-340

- [PDF](#)

Visitors

 ID 37 ,263	 GB 48
 US 1 ,618	 NL 43
 IN 99	 MY 43
 SG 85	 KR 23
 JP 49	 IR 19

Pageviews: 59 ,259

 FLAG counter



Jumlah Fibroblas pada Luka Bakar Derajat II pada Tikus dengan Pemberian Gel Ekstrak Etanol Biji Kakao dan Silver Sulfadiazine

(*The Total Fibroblast on the Second Degree Burns of Rats after Treatment using Ethanolic Extract of Cocoa Beans*)

Muhammad Izat Fuadi¹, Ulfa Elfiah¹, Misnawi²

¹Fakultas Kedokteran Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

²Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
Jln. PB Sudirman No. 90, Jember 68118
e-mail: izatfuadi28@gmail.com

Abstract

The healing process of burns can be disturbed by bacteria and free radicals. Polyphenol (flavonoid and procyanidin) in cocoa have an antibacterial activity, antiinflammatory and antioxidants. This study aimed to investigate the effect of the cocoa beans ethanolic extract on the second degree burns healing process by measuring the number of fibroblasts. The *in vivo* test was done by creating a second degree burns on the mice backs then treated with either: the ethanolic extract of cocoa beans gel 8 %, Silver Sulfadiazine or Normal saline. The number of fibroblasts was counted in histopathology preparations. The result showed the number of fibroblasts 26.67 cells/field of view in Normal saline group; 44.23 cells/field of view in Silver Sulfadiazine group; 50.02 cells/field of view in the ethanolic extract of cocoa beans gel 8 % group. The data analysis showed significant differences between treatment groups. The conclusion was the ethanolic extract of cocoa beans affect the healing process on second degree burns and the number of fibroblasts in the ethanolic extract of cocoa beans gel 8% group was higher than Normal saline and Silver Sulfadiazine groups.

Keywords: ethanolic extract of cocoa beans, polyphenols, flavonoids, procyanidin, second degree burns, Silver Sulfadiazine

Abstrak

Proses penyembuhan luka bakar dapat terhambat oleh bakteri dan radikal bebas. Polifenol (flavonoid dan prosianidin) yang ditemukan pada kakao mempunyai aktivitas antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek gel ekstrak etanol biji kakao terhadap penyembuhan luka bakar derajat II melalui penghitungan jumlah fibroblas. Uji *in vivo* dilakukan dengan membuat luka bakar derajat II pada punggung tikus, dirawat sesuai kelompok perlakuan yaitu gel ekstrak etanol biji kakao 8%, Silver Sulfadiazine atau *Normal saline*. Data didapatkan dari penghitungan jumlah fibroblas pada preparat histopatologi. Hasil penelitian didapatkan jumlah fibroblas 26,67 sel/lapang pandang pada kelompok *Normal saline*; 44,23 sel/lapang pandang pada kelompok Silver Sulfadiazine; 50,02 sel/lapang pandang pada kelompok gel ekstrak etanol biji kakao 8%. Hasil analisis data menunjukkan perbedaan signifikan antar kelompok perlakuan. Kesimpulannya adalah gel ekstrak etanol biji kakao berpengaruh pada penyembuhan luka bakar derajat II dan jumlah fibroblas pada kelompok perlakuan gel ekstrak etanol biji kakao 8% lebih tinggi dari kelompok *Normal saline* dan kelompok Silver Sulfadiazine.

Kata kunci: ekstrak etanol biji kakao, polifenol, flavonoid, prosianidin, luka bakar derajat II, Silver Sulfadiazine.

Pendahuluan

Luka bakar atau *combustio* adalah luka yang disebabkan oleh kontak langsung dengan benda bersuhu tinggi seperti api, air panas, listrik, bahan kimia, radiasi dan dapat menyebabkan komplikasi diantaranya *shock*, infeksi, ketidakseimbangan elektrolit dan masalah distress pernafasan. Selain itu dapat menyebabkan distress emosional dan psikologi yang berat dikarenakan cacat dan kematian [1].

Proses penyembuhan luka terdapat 3 fase yaitu fase inflamasi, fase proliferasi dan fase maturasi (*remodeling*). Pada fase proliferasi terjadi fibroplasia dimana fibroblas disini berperan menonjol dalam sintesis kolagen. Gangguan pada fase ini akan mengakibatkan proses penyembuhan luka semakin lama dan dapat terjadi luka kronis. Proses ini juga dipengaruhi oleh pemakaian produk perawatan luka, karena produk perawatan luka yang kurang tepat akan memperlambat penyembuhan luka [2]. Produk perawatan luka yang umum digunakan adalah pemberian antibiotik Silver Sulfadiazine (*Burnazin®*) 1% dan *Normal saline*.

Banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui kemampuan farmakologi tumbuhan-tumbuhan. Indonesia merupakan salah satu tempat dengan jenis tumbuhan terbanyak di dunia dengan memiliki sekitar 35 ribu jenis tumbuhan tingkat tinggi dan 3500 di antaranya dilaporkan sebagai tumbuhan obat. Salah satu tumbuhan yang dikenal dan terbukti memiliki banyak manfaat di bidang kesehatan adalah tumbuhan coklat (*Theobroma cacao*).

Salah satu produk yang dapat dihasilkan dari pengolahan tumbuhan coklat ini adalah polifenol yang didapatkan dengan cara mengekstrak biji kakao. Senyawa polifenol dalam biji kakao meliputi flavonoid, katekin, epikatekin, prosianidin, antosianidin, tanin kompleks, dan flavonol glikosida. Flavonoid dapat bersifat bakterisidal dan sebagai antioksidan juga memiliki aktivitas anti-inflamasi, aktivitas oestrogenik, aktivitas anti-alergi, efek pada vaskular dan aktivitas antitumor sitotoksik [3].

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa gel ekstrak etanol biji kakao mempunyai pengaruh pada penyembuhan luka bakar derajat II dan membuktikan bahwa terdapat perbedaan jumlah fibroblas pada luka bakar antara pemberian gel

ekstrak etanol biji kakao dan Silver Sulfadiazine.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan *true experimental laboratories* dengan menggunakan *posttest control group design*. Sampel yang digunakan adalah tikus putih (*Rattus novergicus*) jenis *Sprague Dawley* albino jantan sebanyak 15 ekor yaitu 12 tikus untuk perlakuan dan 3 sebagai cadangan. Dari 12 tikus tadi terbagi lagi dalam 3 kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol negatif (*Normal saline*), kelompok kontrol positif (Silver Sulfadiazine), dan kelompok gel ekstrak etanol biji kakao 8%.

Pembutan Gel Ekstrak Etanol 8%

Karbopol 2% dan propilen glikol 15% dikembangkan dengan sebagian aquades 71%. Kemudian trietanolamin (TEA) 4% dimasukkan tetes demi tetes ke dalam karbopol dan propilen glikol yang telah dikembangkan. Aduk hingga homogen dan tambahkan sisa aquades hingga membentuk masa gel yang homogen. Masukkan sedikit basis gel sebanyak 27,6 gram ke dalam lumpang, kemudian ekstrak etanol biji kakao (*Theobroma cacao*) 2,4 gram ditambahkan dan digerus homogen dan didapatkan gel ekstrak etanol biji kakao sebanyak 30 gram.

Pembuatan Luka Bakar Derajat II

Adaptasi tikus dilakukan selama 7 hari lalu tikus dicukur bulunya pada bagian punggung lalu didiamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam dilakukan pembiusan menggunakan ketamin 0,5-0,6 ml secara intramukular per ekor agar tikus tidak terlalu merasakan sakit saat pembuatan luka bakar derajat II. Luka bakar ini diperoleh dari uang logam berbahan aluminium bronze dengan berat 5,34 gram, tebal 1,83 mm, dan diameter 24 mm. Logam tersebut dibalut dengan kassa dan direndam pada air mendidih dengan suhu 98°C selama 3 menit selanjutnya bahan tersebut diempelkan pada kulit bagian belakang tikus *Sprague Dawley* selama 10 detik.

Perawatan Luka Bakar Derajat II

Setelah tikus diberi luka bakar derajat II (*partial thickness*), luka dibersihkan dengan *Normal saline*. Selanjutnya, tikus diperlakukan sesuai kelompok perlakuan. Kelompok 1 hanya dibersihkan dengan *Normal saline*, kelompok 2 diolesi gel ekstrak etanol biji kakao dengan konsentrasi 8% sebanyak 0,5 gram sehari sekali

selama 10 hari, dan kelompok 3 diberi perlakuan dengan pemberian Silver Sulfadiazine (*Burnazin®*) 1 % sebanyak 0,5 gram sehari sekali selama 10 hari. Area yang telah diolesi kemudian ditutup dengan kasa dan direkatkan dengan plester yang tidak menyebabkan iritasi. Hewan coba dicegah agar tidak menggaruk, melepas, memakan atau menjilat gel yang telah diaplikasikan.

Pembuatan Preparat Histopatologi

Pada hari ke-11, tikus dieuthanasia dengan cara dislokasi servikal dan kulit yang diberi perlakuan diambil mulai dari tepi luka dan sedalam jaringan subkutan. Selanjutnya kulit tikus dimaksukkan ke formalin 10% untuk fiksasi jaringan. Setelah itu kulit dibuat preparat histopatologi menggunakan pewarnaan HE.

Pengamatan Preparat Histopatologi


Pengamatan histopatologi dengan cara menghitung jumlah fibroblas. Penghitungan dilakukan dengan mikroskop cahaya pada enam lapang pandang secara sistematis dengan pembesaran 400x dan dengan bantuan mikrometer *graticulae*. Penghitungan dilakukan oleh 2 orang dengan metode *blinding* kemudian dari ke enam lapang pandang fibroblas yang teridentifikasi dijumlah dan dicari rata-ratanya.

Analisi Data

Analisis data dilakukan secara komputerisasi dengan SPSS 21 PS dengan taraf signifikan $p<0,05$. Jumlah fibroblas dianalisis dengan uji normalitas data, uji homogenitas, uji One Way ANOVA dan uji Post Hoc Metode LSD. Data hasil analisis disajikan dalam bentuk mean \pm SD.

Hasil Penelitian

Gambaran fibroblas hasil perlakuan dapat dilihat pada gambar 1. Hasil penghitungan jumlah fibroblas pada tiap perlakuan dapat dilihat pada tabel 1.



Gambar 1. Gambaran histopatologi kulit tikus dengan mikroskop cahaya perbesaran 400x.


Tabel 1. Rata-rata jumlah fibroblas dari 6 lapang pandang

Kelompok	Rata-rata dari 6 lapang pandang \pm SD
1. Normal saline	28,17 \pm 1,71
2. Normal saline	30,67 \pm 6,49
3. Normal saline	22,83 \pm 2,88
4. Normal saline	25,00 \pm 3,51
1. Gel Kakao 8%	51,58 \pm 10,96
2. Gel Kakao 8%	44,33 \pm 0,52
3. Gel Kakao 8%	50,25 \pm 7,89
4. Gel Kakao 8%	53,92 \pm 14,49
1. Silver Sulfadiazine	42,42 \pm 5,36
2. Silver Sulfadiazine	41,00 \pm 1,06
3. Silver Sulfadiazine	46,83 \pm 1,51
4. Silver Sulfadiazine	46,67 \pm 1,92

Uji normalitas data menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,170 ($p>0,05$) yang berarti bahwa sebaran data normal sedangkan pada uji homogenitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,960 ($p>0,05$) yang berarti bahwa varian data sama.

Tabel 2. Rata-rata jumlah fibroblas

Kelompok	Rata-rata jumlah fibroblas \pm SD
1. Normal Saline	26,67 \pm 3,45
2. Gel Kakao 8%	50,02 \pm 4,08
3. Silver Sulfadiazine	44,23 \pm 2,97



Gambar 2. Grafik rata-rata jumlah fibroblas

Uji One Way ANOVA menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$) yang berarti bahwa terdapat perbedaan jumlah fibroblas secara bermakna pada masing-masing kelompok. Pada uji Post Hoc metode LSD menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$) antara kelompok *Normal saline* dan gel kakao 8%. Nilai signifikansi yang sama juga didapatkan antara kelompok *Normal saline* dan Silver Sulfadiazine yaitu sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Sedangkan pada kelompok Silver Sulfadiazine jika dibandingkan dengan gel kakao 8% didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,046 ($p < 0,05$). Ketiga nilai signifikansi $< 0,05$ yang berarti bahwa terdapat perbedaan antar kelompok perlakuan.

Pembahasan

Pada hasil penelitian didapatkan bahwa kelompok kontrol negatif (*Normal saline*) didapatkan rata-rata jumlah fibroblas 26,67 sel/lapang pandang dan merupakan hasil terendah jika dibandingkan dengan kelompok lain. Hal ini menandakan bahwa *Normal saline* hanya digunakan untuk membersihkan luka dan menghilangkan benda asing yang menempel pada luka [2].

Pada kelompok kontrol positif (Silver Sulfadiazine) (*Burnazin®*) 1% didapatkan rata-rata jumlah fibroblas 44,23 sel/lapang pandang. Hasil ini lebih tinggi dari kelompok kontrol negatif (*Normal saline*) namun lebih rendah dari kelompok yang diberi gel ekstrak etanol biji kakao 8% yang rata-rata jumlah fibroblasnya 50,02 sel/lapang pandang. Silver Sulfadiazine (*Burnazin®*) 1% merupakan obat topikal *gold standard* yang diberikan pada luka bakar. Obat ini merupakan obat golongan sulfonamid yang memiliki sifat antibakteri dengan cara berkompetisi dengan substrat *PABA* untuk sintesis enzim *dihidropetrotat* sehingga mencegah sintesis asam folat bakteri. Selain itu, Silver Sulfadiazine (*Burnazin®*) 1% mampu merangsang sel-sel seperti makrofag untuk menghasilkan *growth factor* dan sitokin dalam proses penyembuhan luka seperti *TGF-β*, *EGF*, *IL-1*, *IL-4* dan *IL-8* sehingga bersama dengan sifat antibakteri dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Selain itu Silver Sulfadiazine mempunyai efek positif pada proliferasi fibroblas yang merupakan penghasil kolagen dan fibronektin [4]. Akan tetapi karena sifat anti infeksinya, Silver Sulfadiazine (*Burnazin®*) 1% tidak memberikan kelembaban

pada luka sehingga tidak mendukung pada proses penyembuhan yang lebih cepat [5].

Hasil rata-rata jumlah fibroblas pada kelompok gel ekstrak etanol biji kakao dengan konsentrasi 8% sebesar 50,02 sel/lapang pandang. Hasil ini lebih tinggi dari kelompok yang hanya dibersihkan dengan kontrol negatif (*Normal saline*) dan lebih tinggi dari kelompok kontrol positif yang dirawat dengan Silver Sulfadiazine (*Burnazin®*) 1%. Hal ini terjadi karena, kandungan yang terdapat pada ekstrak etanol biji kakao dan bentuk sediaannya yang bersifat lembab yaitu gel. Kandungan ekstrak etanol biji kakao yaitu polifenol ini banyak sekali macamnya seperti flavonoid dan prosianidin. Flavonoid memiliki efek antioksidan yang dapat mempercepat fase inflamasi dengan cara menangkap radikal bebas dan mencegah reaksi oksidasi dengan meningkatkan aktifitas enzim *Superoxide dismutase (SOD)* dan *glutation transferase* [2]. Selain itu, flavonoid memiliki aktivitas antiinflamasi yang bekerja menghambat fase penting dalam biosintesis prostaglandin yaitu pada lintasan siklooksigenase dan juga memiliki aktivitas antibakteri melalui hambatan fungsi *gyrase* bakteri sehingga kemampuan replikasi dan translasi bakteri dihambat [2,3].

Flavonoid dengan aktivitas antiinflamasinya dan prosianidin dapat merangsang sel-sel seperti makrofag untuk menghasilkan *growth factor* dan sitokin seperti *EGF*, *TGF-β*, *IL-1*, *IL-4*, *IL-8*. *TGF-β* dan *EGF* berfungsi untuk induksi proliferasi dan migrasi fibroblas serta induksi fibroblas dalam produksi matriks ekstra seluler. *IL-1*, *IL-4* dan *IL-8* berfungsi menginduksi proses kemotaksis fibroblas dan keratinosit, mengaktifkan proliferasi fibroblas, menginduksi sintesa kolagen dan proteoglikan, mengaktifkan makrofag untuk memulai proses kemotaksis, menginduksi marginasi dan maturasi keratinosit [6].

Selain dari kandungan ekstrak etanol biji kakao, sediaan yang berupa gel dapat mempercepat proses penyembuhan karena sifatnya yang lembab. Gel dengan kandungan air dapat mempertahankan sifat lembab pada daerah luka dan sekitar luka [2]. Keadaan lembab dapat meningkatkan reepitelisasi dan migrasi epitel sehingga proses penyembuhan luka bisa lebih cepat. Reepitelisasi ini terjadi beberapa jam setelah luka. Sel epitel tumbuh dari tepi luka, bermigrasi kejaringan ikat yang masih hidup. Epidermis segera mendekati tepi luka dan menebal dalam 24 jam setelah luka [7]. Keadaan lembab pada luka diperlukan untuk aktivitas *growth factor* seperti *TGF-β* dan *EGF*,

pengiriman oksigen, aktivitas permulaan enzim proteolitik dan pengiriman nutrisi yang lebih efektif [8].

Selain itu, sediaan gel yang bersifat dingin dan menyegukkan pada luka dapat memberikan keadaan nyaman sehingga nyeri dapat berkurang [2]. Nyeri merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat penyembuhan luka. Nyeri bila tidak dikelola dengan tepat akan berakibat memperpanjang fase katabolik berupa peningkatan glukagon, kortikoid dan resistensi insulin. Peningkatan hormon glukokortikoid mempengaruhi proses anti inflamasi, menghambat pembentukan fibroblast, mengganggu sintesis kolagen sehingga menghambat penyembuhan luka. Dalam keadaan nyeri, β endorfin yang dilepas pituitaria kadarnya akan meningkat dan mempunyai sifat mensupresi makrofag, sehingga produksi *growth factor* dapat menurun. Penurunan beberapa faktor pertumbuhan ini akan berakibat terjadinya hambatan kesembuhan luka [7].

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa gel ekstrak etanol biji kakao mempunyai pengaruh terhadap proses penyembuhan luka bakar derajat II (*partial thickness*) dan jumlah fibroblas kelompok gel ekstrak etanol biji kakao 8 % lebih tinggi dari kelompok *Normal saline* dan kelompok Silver Sulfadiazine.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efek gel ekstrak etanol kakao 8% pada rentang yang lebih luas yaitu pada ketiga fase penyembuhan luka.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didanai oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] Moenadjat. Luka Bakar Masalah dan Tatalaksana. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2009.
- [2] Subandi, Rini IK, Maslahatun L. Pengaruh Pemberian Topikal Ekstrak Daun Cincau Hijau (*Cyclea barbata L. Miers*) terhadap Peningkatan Reepitelisasi Luka Bakar Derajat IIB pada Tikus Putih (*Rattus Norvegicus*) Galur Wistar. Malang: Universitas Brawijaya. 2014.
- [3] Sartini. Pemanfaatan Kakao Sebagai Sumber Bahan Aktif/Pembantu Sediaan Farmasi (Obat Dan Kosmetik) Dan Suplemen Makanan. Makassar: Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. 2013.
- [4] Esfahani, Imanieh, Khoshneviszadeh, Meshksar, Noorafshan, Geramizadeh, Ebrahimi, Handjani, Tanideh. The Healing Effect of Arnebia Euchroma in Second Degree Burn Wounds in Rat as an Animal Model. Iran: Iranian Red Crescent Med J. 2012;14(2): 70-74.
- [5] Nugraha A, Muhartono. Perbandingan Tingkat Kesembuhan Luka Bakar Derajat II antara Pemberian Madu Topikal Nektar Kopi dengan Silver Sulfadiazine pada Tikus Putih (*Rattus norvegicus*) Jantan Galur Sprague Dawley". Lampung: MAJORITY (Medical Journal of Lampung University). 2012: 24-32.
- [6] Hidayat TSN. Peran Topikal Ekstrak Gel Aloe Vera Pada Penyembuhan Luka Bakar derajat Dua Dalam. Surabaya: Universitas Airlangga. 2013.
- [7] Prabakti Y. Perbedaan Jumlah Fibroblas di Sekitar Luka Insisi pada Tikus yang Diberi Infiltrasi Penghilang Nyeri Levobupivakain dan tidak diberi Levobupivakain. Semarang: Universitas Diponegoro. 2005.
- [8] Nurdiana, Hariyanto P, Musfirah. Perbedaan Kecepatan Penyembuhan Luka Bakar Derajat Dua Antara Perawatan Luka Menggunakan Virgin Coconut Oil (*Cocos nucifera*) Dan Normal Salin Pada Tikus Putih (*Rattus norvegicus*) Strain Wistar. Malang: Universitas Brawijaya. Tanpa Tahun.