



**PENGARUH BERAT/RINGAN DIARE TERHADAP STATUS GIZI
BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KALIWATES
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Kedokteran (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Kedokteran

Oleh

**Desy Damayantie
NIM 022010101025**

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

RINGKASAN

Pengaruh Berat/Ringan Diare Terhadap Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kaliwates Kabupaten Jember. Desy Damayantie, 02010101025; 2007:58 halaman; Jurusan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Jember.

Sampai saat ini penyakit diare merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kesakitan pada masa anak-anak khususnya pada balita. Selain itu, diare dapat menyebabkan kurang gizi bahkan kematian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berat/ringan diare terhadap status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Kaliwates Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian dekriptif analitik dengan desain studi *cross sectional*, yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kaliwates Kabupaten Jember pada bulan Januari-Juli 2006. Sampel penelitian ini adalah ibu balita dan balita (usia 0-59 bulan) yang sedang menderita penyakit diare dan tercatat di register Puskesmas Kaliwates periode Januari-Juli 2006. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner untuk mengetahui kondisi diare balita dan penilaian satus gizi melalui metode antropometri dengan parameter berat badan terhadap usia (BB/U) dengan melihat dari KMS balita. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *total sampling*. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis Regresi Linier sederhana dengan $\alpha<0,05$.

Dari hasil analisis uji statistik penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar balita yaitu sebanyak 25 (54,35%) balita yang menderita diare ringan ternyata status gizinya masih baik dan 2 (100%) balita yang menderita diare berat ternyata memiliki status gizi yang buruk pula.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa berat/ringan diare mempunyai pengaruh terhadap status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Kaliwates Kabupaten Jember.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Diare.....	4
2.2 Status Gizi.....	15
2.3 Gambaran Lokasi Penelitian.....	24
2.4 Kerangka Konseptual.....	26
2.5 Hipotesis.....	27

BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.3 Instrumen Penelitian.....	28
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian.....	28
3.5 Identifikasi Variabel.....	29
3.6 Definisi Operasional Penelitian.....	30
3.7 Rancangan Penelitian.....	32
3.8 Teknik Analisis Data.....	32
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.2 Pembahasan.....	38
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN.....	45