



**UJI EFEKTIVITAS INSEKTISIDA NABATI UNTUK
MENGENDALIKAN HAMA KUMBANG DAUN (*Phyllotreta vitata* F)
PADA TANAMAN SAWI (*Brassica rapa* var. *parachinensis* L)**

SKRIPSI

Oleh

**Ridwan Isnaeni Mf
NIM 081510501124**

**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2012**



**UJI EFEKTIVITAS INSEKTISIDA NABATI UNTUK
MENGENDALIKAN HAMA KUMBANG DAUN (*Phyllotreta vitata* F)
PADA TANAMAN SAWI (*Brassica rapa* var. *parachinensis* L)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana Pada Program Studi Agroteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Jember**

Oleh

**Ridwan Isnaeni Mf
NIM 081510501124**

**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2012**

SKRIPSI

UJI EFEKTIVITAS INSEKTISIDA NABATI UNTUK MENGENDALIKAN HAMA KUMBANG DAUN (*Phyllotreta vitata* F) PADA TANAMAN SAWI (*Brassica rapa* var. *parachinensis* L)

Oleh

Ridwan Isnaeni MF

NIM 081510501124

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama

: Dr. Ir. Mochammad. Hoesain, MP
NIP. 196401071988021001

Dosen Pembimbing Anggota

: Ir. Mohammad. Wildan Jadmiko, MP
NIP. 196505281990031001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Uji Efektivitas Insektisida Nabati Untuk Mengendalikan Hama Kumbang Daun (*Phyllotreta vitata* F) Pada Tanaman Sawi (*Brassica rapa* var. *parachinensis* L) telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 01 Nopember 2012

Tempat : Fakultas Pertanian Universitas Jember

Tim Penguji:

Penguji I,

Dr. Ir. Mochammad. Hoesain, MP
NIP. 196401071988021001

Penguji II,

Penguji III,

Ir. Mohammad. Wildan Jadmiko, MP.
NIP. 196505281990031001

Ir. Hari Purnomo, M.Si., Ph.D, DIC
NIP 196606301990031002

Mengesahkan
Dekan
Fakultas Pertanian,

Dr. Ir. Jani Januar, MT.
NIP 195901021988031002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Isnaeni MF

NIM : 081510501124

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Uji Efektivitas Insektisida Nabati Untuk Mengendalikan Hama Kumbang Daun (*Phyllotreta vitata* F) Pada Tanaman Sawi (*Brassica rapa* var. *parachinensis* L), adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya siap bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 November 2012

Yang menyatakan,

Ridwan Isnaeni MF
NIM. 081510501124

RINGKASAN

Uji Efektivitas Beberapa Insektisida Nabati Untuk Mengendalikan Hama Kumbang Daun (*Phylloptreta vitata* F) Pada Tanaman Sawi (*Brassica rapa* var. *parachinensis* L), Ridwan Isnaeni MF, 081510501124. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Sawi adalah salah satu komoditas sayuran yang banyak diusahakan oleh petani karena kandungan gizi dan nilai ekonomisnya. Salah satu kendala dalam budidaya tanaman sawi adalah serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan). Gangguan hama merupakan salah satu kendala dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan produksi sawi karena dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas dari tanaman sawi. Salah satu hama yang menyerang tanaman sawi adalah kumbang daun *Phylloptreta vitata*. Pengendalian yang umum dilakukan oleh petani adalah menggunakan pestisida sintetik, penggunaan pestisida berlebih akan berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu perlu adanya cara alternatif untuk mengendalikan hama pada tanaman sawi, salah satunya adalah dengan menggunakan insektisida nabati. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui jenis insektisida nabati ekstrak daun pacar cina, sirsat, srikaya, mahoni, dan mimba yang efektif mengendalikan hama *P. vitata* pada tanaman sawi.

Penelitian dilakukan di Dusun Manggis desa Suko Rambi RT/RW 2/2 Kecamatan Suko Rambi Kabupaten Jember. Penelitian dimulai bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2012. Penelitian ini untuk mengetahui keefektifan ekstrak daun pacar cina, sirsat, srikaya, mahoni, dan mimba terhadap intensitas serangan dan jumlah populasi kumbang daun. Percobaan dilakukan dengan menyemprot ekstrak daun pacar cina, sirsat, srikaya, mahoni, dan mimba dengan konsentrasi (100 ml/L, 100 ml/L, 100 ml/L, 100 ml/L, dan 25 ml/L) pada tanaman sawi dengan lebar plot 2 x 2 m yang berisi 80 tanaman sawi, kemudian dipilih 10 tanaman sampel secara acak pada tiap plot, aplikasi dilakukan sebanyak tiga kali. Percobaan tiap ekstrak insektisida nabati diulang sebanyak empat kali (n=40).

Pengamatan terhadap intensitas serangan dan jumlah populasi hama dilakukan setiap tiga hari setelah aplikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengamatan ke-6 umur tanaman 24 HST perlakuan insektisida nabati ekstrak daun pacar cina berpengaruh nyata terhadap intensitas serangan. Presentase intensitas serangan tertinggi terdapat pada perlakuan (Kontrol) F0 sebesar 42%, sedangkan intensitas serangan paling rendah adalah pada perlakuan ekstrak pacar cina dengan intensitas serangan sebesar 30%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada pengamatan ke-6 umur tanaman 24 HST, semua perlakuan menunjukkan tidak ada interaksi dalam menekan jumlah populasi hama pada tanaman sawi.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, ekstrak daun pacar cina mampu menekan intensitas serangan tertinggi pada aplikasi ke-3 pada umur tanaman 24 HST dengan rata-rata presentase serangan 30%, sedangkan pada pengaruh jumlah populasi semua perlakuan tidak berbeda atau non signifikan, dengan jumlah populasi terrendah pada perlakuan ekstrak daun pacar cina (F2) dan ekstrak daun mimba (F1) yaitu masing-masing rata-rata jumlah hama/10 tanaman 0,08 ekor, dan jumlah hama tertinggi pada perlakuan kontrol (F0) dengan jumlah rata-rata hama/10 tanaman 0,28 ekor.

SUMMARY

Test of Effectiveness of Several Biological Insecticides for Controlling Turnip Flea-Beetle Pests (*Phylloptreta vitata F*) on Mustard Plants (*Brassica few var. Parachinensis L*), Ridwan Isnaeni MF, 081510501124. Agrotechnology Study Program, Faculty of Agriculture, University of Jember.

Mustard is one of many vegetables cultivated by farmers due to the nutrients and economic value. One of obstacles in mustard crop is the attack of Plant Disturbing Organism. Pest is one of the obstacles in maintaining and increasing the production of mustard because it can reduce the quality and quantity of mustard plant. One of the pests that attack mustard plant is turnip flea beetle *Phylloptreta vitata*. The common control by farmers is the use of synthetic pesticides; however, the excessive use of pesticides will lead to disruption of the balance of ecosystem. Therefore, it is required to apply an alternative way to control pests on mustard plants, one of which is by using biological insecticides. This research was intended to identify the type of biological insecticides extracted from leaves of mock lime, soursop, sugar apple, mahogany and neem which were effective to control *P. vitata* pests on mustard plants.

The research was conducted in the village of Manggis Sub-Village, Suko Rambi RT/RW 2/2, District of Suko Rambi, Jember Regency. The research was undertaken from February to May 2012. The research was intended to identify the effectiveness of the leaf extract of leaves of mock lime, soursop, sugar apple, mahogany and neemon the intensity of attacks and the number of turnip flea beetle population. The experiment was conducted by spraying the leaf extract of leaves of mock lime, soursop, sugar apple, mahogany and neem with concentrations (100 ml/L, 100 ml/L, 100 mL/L, 100 ml/L, and 25 ml/L) to the mustard plants with plot width of 2 x 2 m containing 80 plants mustard, then selecting at random the sample of 10 plants in each plot. The application was performed three times. The experiment of each plant insecticide extract was repeated four times ($n = 40$). Observation of the intensity of attacks and the number of pest population were conducted every three days after application.

The results showed that on the 6th observation within the age of the plant of 24 days after planting, the insecticide treatment of mock lime leaf extracts significantly affected the intensity of the attacks. The highest percentage of attack intensity was on treatment (Control) F0 by 42%, while the lowest intensity of the attack was on the treatment of mock lime extract with the attack intensity of 30%. The results also showed that on the 6th observation within plant age of 24 days after planting, all treatments showed no interaction in suppressing the pest population in mustard plants.

Based on the overall results, mock lime leaf extract could diminish the highest intensity of attacks in the 3rd application at the age of 24 days after planting with an average of attack percentage of 30%, while all treatments did not insignificantly affect the population, with the lowest population by the treatments of mock lime leaf extracts (F2) and neem leaf extracts (F1) was respectively in the average number of pests/10 plants of 0.08, and the highest number of pest in control treatment (F0) by the average number of pests/10 plants of 0.28.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Uji Efektivitas insektisida Nabati Untuk mengendalikan Hama (*Phyllotreta vitata* F). Pada Tanaman sawi (*Brassica rapa* var. *parachinensis* L) yang merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Program Studi Agroteknologi minat Hama dan Penyakit Tumbuhan fakultas Pertanian Universitas Jember,

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan ketulusan hati dan rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Jani Januar, MT, selaku Dekan Fakultas Pertanian
2. Bapak Dr. Ir. Moh. Setyo Poerwoko, MS, selaku ketua program studi Agroteknologi.
3. Bapak Ir. Paniman Ashna Mihardja, MP, selaku ketua jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan.
4. Bapak Dr. Ir. Moh Hoesain, MP, selaku pembimbing I Yang telah banyak memberikan waktu, dorongan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak Ir. Moh Wildan Jadmiko, MP, selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk bimbingan serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Ir. Hari Purnomo, M.Si., Ph.D, DIC, selaku pembimbing III yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi hingga selesai.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing dan membeberikan ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Pertanian Universitas Jember.

8. Kedua orang tuaku, bapak Machfud dan Ibuku tercinta Sapiye yang tiada henti memberi do'a semangat dan kasih sayang, dan dorongan baik moril maupun material kepada penulis.
9. Kakaku Eka Yuliantini MF serta adikku Agung Ilham Pamungkas MF dan Ainun Umi Lestari MF yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
10. Avita Sari calon pendamping hidupku yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis serta selalu berada disampingku hingga skripsi ini selesai.
11. Teman-teman seperjuanganku agrotek 2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
12. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
Mudah-mudahan segala amal baik yang demikian besar artinya bagi penulis mendapat imbalan setimpal dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kenikmatan dan kemudahan dari segenap sisi kehidupan atas segala bantuan dan amalan yang telah diberikan kepada penulis.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Jember, 01 Nopember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Tanaman Sawi (<i>Brassica rapa</i> var. <i>Parachinensis</i> L)	4
2.2 Hama Tanaman Sawi.....	5
2.3 Pengendalian OPT Pada Tanaman Sawi.....	6
2.3.1 Pengendalian Secara Kimia.....	6
2.3.2 Pengendalian Secara Alami (Pestisida Nabati).....	7
2.4 Pestisida Nabati.....	8
2.4.1 Sirsat (<i>Annona muricata</i> L.)	9
2.4.2 Srikaya (<i>Annona squamosa</i> L.)	10
2.4.3 Pacar Cina (<i>Aglaia odorata</i> L)	12
2.4.4 Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i> J)	13
2.4.5 Mimba (<i>Azadirachta indica</i> J)	14
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	17

3.1	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	17
3.2	Bahan dan Alat	17
3.3	Metode Penelitian	17
3.3.1	Persiapan Penelitian	17
3.3.1.1	Pembuatan petak- petak bedengan	17
3.3.1.2	Pembuatan Pestisida Nabati	17
3.3.1.3	Inventarisasi hama	17
3.3.2	Pelaksanaan Penelitian.....	17
3.3.2.1	Perlakuan dengan pestisida nabati	17
3.3.2.2	Metode pengamatan	19
3.3.2.2.1	Intensitas serangan	19
3.3.2.2.2	Populasi hama	20
3.4	Rancangan Penelitian	20
3.5	Analisis Data	21
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	22	
4.1	Intensitas Serangan Hama <i>Phyllotreta vitata</i> Pada Tanaman Sawi	22
4.2	Jumlah Populasi Hama Tanaman Sawi (<i>Phyllotreta vitata</i>)	26
BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN	30	
5.1	Simpulan	29
5.2	Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30	
LAMPIRAN	33	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1	Rata-rata Tingkat Serangan Hama <i>Phyllotreta vitata</i> Pada Tanaman Sawi.....	24
2	Rata-rata Populasi Hama <i>phylloreta vitata</i> Pada Tanaman Sawi	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1	Hama <i>Phylotreta vitata</i>	5
2	Daun sirsat	9
3	Daun srikaya	11
4	Daun pacar cina	12
5	Daun mahoni	14
6	Daun mimba	15
7	Serangan hama <i>Phylotreta vitata</i>	25
8	Intensitas Serangan <i>Phylotreta vitata</i>	25
9	Hama <i>Phylotreta vitata</i> pada tanaman sawi	28

DAFTAR LAMPIRAN

	Judul	Halaman
Data intensitas serangan <i>P. vitata</i>	33	
Hasil Anlisis Repeated Measures Anova (Intensitas Serangan)	33	
Uji lanjut Tukey (Intensitas Serangan)	34	
Hasil Uji Beda Jujur	34	
Data populasi <i>P. vitata</i>	35	
Hasil Anlisis Repeated Measures Anova (Intensitas Serangan)	35	
Uji lanjut Tukey (Intensitas Serangan)	36	
Hasil Uji Beda Jujur	36	