


ISSN 1693-6485

# stomatognatic

Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Jember



stomatognatic  
(J.K.G.unej)

Vol. 10

No. 2

Hal. 51 - 104

Jember  
Mei 2013

ISSN  
1693-6485

	Halaman
<b>PEMBUATAN DENTAL RECORD YANG BAIK: IDENTIFIKASI IMIGRAN KORBAN KAPAL TENGGELAM DI TRENGGALEK 2011</b> Masniari Novifa, Waloejo Noegroho	51 – 53
<b>EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN BENALU NANGKA (<i>Macrosolencochinchinensis</i> (Lour.) van Tiegh) DALAM MENCEGAH PERTUMBUHAN TUMOR PARU MENCIT BETINA</b> Dwi Nurahmanto, Edy Meiyanto	54 – 58
<b>PENGARUH PENAMBAHAN ASAM LAKTAT SEBAGAI ENHANCER TERHADAP PENETRASI PERKUTAN KAFEIN DALAM BASIS GEL</b> Lidya Ameliana, Lusia Oktara RKS, dan Devi Dwi N	59 – 66
<b>POKET PERIODONTAL PADA BURUH PEROKOK</b> Kriswiharsi Kun Saptorini, Agus Perry Kusurna	67– 70
<b>MOLECULAR DOCKING, SINTESIS DAN UJI AKTIVITAS SITOTOKSIK SENYAWA 1-(3-KLOROBENZOIL)-1,3-DIMETILUREA</b> Dian Agung Pangaribowo	71 – 74
<b>SISTEM PENGHANTARAN OBAT TERTARGET, MACAM, JENIS-JENIS SISTEM PENGHANTARAN, DAN APLIKASINYA</b> Lina Winarti	75 – 81
<b>PENGARUH NIKOTIN TERHADAP JUMLAH SEL LEYDIG PADA MENCIT (<i>Mus musculus</i>)</b> Iis Rahmawati	82 – 85
<b>ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN ANTIINFEKSI PADA INFEKSI OPORTUNISTIK PASIEN HIV/AIDS RAWAT INAP DI RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA</b> Sinta Rachmawati	86 – 92
<b>POTENSI PENGGUNAAN KITOSAN RANTAI PENDEK SEBAGAI PEMBAWA DALAM PENGHANTARAN GEN; EVALUASI IN VITRO</b> Lina Winarti, Ronny Martien, Sismindari	93 – 98
<b>CELAH PALATUM (PALATOSCIZIS)</b> Zainul Cholid	99– 104

# MOLECULAR DOCKING, SINTESIS DAN UJI AKTIVITAS SITOTOKSIK SENYAWA 1-(3-KLOROBENZOIL)-1,3-DIMETILUREA

Dian Agung Pangaribowo

Bagian Kimia Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Jember

## ABSTRACT

A novel 1-(3-chlorobenzoyl)-1,3-dimethylurea has been designed, synthesized, structurally determined, and the *in vitro* cytotoxic activity was evaluated. Docking simulation was performed to position this compound into the Checkpoint kinase 1 (Chk1) active site to determine the probable binding model. Synthesis of 1-(3-chlorobenzoyl)-1,3-dimethylurea was completed by acylation reaction between 1,3-dimethylurea and 3-chlorobenzoyl chloride. The purity of synthesized product was determined by Thin Layer Chromatography and melting point measurement. Structure identification was performed by UV spectrophotometer, FT-IR and NMR spectrometer. Antiproliferative assay result demonstrated that this compound possessed good cytotoxic activity against HeLa cells, which is comparable to the positive control. This compound with potent cytotoxic activity might be a potential anticancer agent.

**Keywords** - 1-(3-chlorobenzoyl)-1,3-dimethylurea, cytotoxic activity, molecular docking

**Korespondensi (correspondence):** Dian Agung Pangaribowo; Jl. Karangrejo X No. 39 Surabaya 60243; Email: agung.pangaribowo@gmail.com

Kanker merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia dan negara lain di dunia. Sebagai negara berkembang, prevalensi penyakit tumor/kanker di Indonesia adalah 4,3 per 1.000 penduduk. Kanker merupakan penyebab kematian nomor 7 (5,7%) setelah stroke, tuberkulosis, hipertensi, cedera, perinatal, dan Diabetes Mellitus<sup>(1)</sup>. Diperkirakan pada tahun 2012 terdapat 1.638.910 kasus kanker baru di Amerika Serikat, dengan perkiraan kasus kematian sejumlah 577.190<sup>(2)</sup>.

Beberapa penelitian telah dilakukan pada turunan urea sebagai senyawa antineoplastik. Song (2009) mensintesis 14 senyawa baru turunan fenilurea<sup>(3)</sup>. Diantara senyawa analog tersebut, senyawa dengan gugus bromoasetil pada posisi N' menunjukkan aktivitas terhadap delapan jenis sel tumor dengan nilai IC<sub>50</sub> berkisar antara 0,38 sampai 4,07 µM. Saeed (2010) melakukan sintesis turunan tiourea yang berikatan dengan gugus benzotiazol<sup>(4)</sup>. Uji aktivitas antikanker turunan tiourea tersebut dilakukan dengan menggunakan sel HeLa dan MCF-7. Dari penelitian didapatkan nilai IC<sub>50</sub> senyawa turunan tiourea dengan menggunakan sel MCF-7 berkisar antara 18,10-45,72 µM, dan pada sel HeLa nilai IC<sub>50</sub> berkisar antara 38,85-75,13 µM. Hardjono (2012) melakukan modifikasi struktur 1-(benzotiazol)urea dan mencari hubungan kuantitatif struktur aktivitas sitotoksiknya secara *in vitro* terhadap sel HeLa<sup>(5)</sup>. Struktur senyawa turunan urea dan tiourea tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Rancangan sintesis dalam penelitian ini adalah melakukan reaksi asilasi salah satu gugus amina pada 1,3-dimetilurea dengan 3-klorobenzoyl klorida dalam pelarut

tetrahidrofur, dalam suasana basa dengan trietilamin. Prosedur sintesis senyawa turunan urea ini mengacu pada reaksi Schotten-Baumann yang telah dimodifikasi<sup>(6)</sup>.

Uji *in silico* dilakukan dengan melakukan proses docking molekul kandidat obat terhadap reseptor melalui simulasi komputer. Docking molekul senyawa 1-(3-klorobenzoyl)-1,3-dimetilurea dilakukan terhadap reseptor Chk1 yang dapat diunduh dari Protein Data Bank. Penentuan aktivitas antikanker turunan 1-(3-klorobenzoyl)-1,3-dimetilurea dilakukan secara *in vitro* dengan metode MTT menggunakan sel HeLa, sesuai dengan uji aktivitas antikanker turunan urea pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan senyawa 1-(3-klorobenzoyl)-1,3-dimetilurea dengan aktivitas antikanker yang lebih besar dibandingkan kontrol positif, yaitu hidroksiurea.

## BAHAN DAN METODE

**Bahan baku sintesis:** 1,3-Dimetilurea p.s (Merck), 3-Klorobenzoyl klorida p.s (Aldrich), Tetrahidrofur p.a (Merck), Etanol p.a (Merck), Trietilamin p.a (Merck)

**Bahan uji sitotoksik:** Reagen MTT [3-(4,5-dimetilthiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolium bromida]; Fetal Bovine Serum (FBS); penisilin; streptomisin; Kultur sel kanker HeLa; DMSO (dimetil sulfoksida); PBS (phosphoric buffer solution); SDS (sodium dodesil sulfat).

## Alat

Uji kemurnian senyawa hasil sintesis menggunakan *melt-temp electrothermal* dan plat KLT GF254. Identifikasi gugus kromofor menggunakan Spektrofotometer UV HP 8452A Diode Array pada kisaran panjang gelombang, λ= 200-400 nm dengan

konsentrasi 10 ppm dalam pelarut etanol. Analisis gugus fungsi menggunakan Spektrofotometer FT-IR PERKIN ELMER *Spectrum One*. Sampel padatan yang digerus bersama KBr kemudian dibentuk menjadi cakram tipis dan serapannya diukur pada daerah infra merah. Konfirmasi struktur lebih lanjut ditentukan dengan  $^1\text{H-NMR}$  dan  $^{13}\text{C-NMR}$ .

#### Metode molecular docking

*Molecular docking* senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea dilakukan dengan menggunakan program *Molegro Virtual Docker (MVD)*. Ligan di *docking* pada sisi aktif reseptor Checkpoint kinase 1 (2YWP.pdb). Model pengikatan ligan reseptor dilihat melalui ikatan Hidrogen ligan reseptor dan nilai *Rerank Score*.

#### Metode sintesis

Pada labu alas bulat 250 ml, dicampur 0,08 mol 1,3-dimetilurea dengan 50 ml tetrahidrofuran dan 0,08 mol trietilamin. Tambahkan larutan 3-klorobenzoil klorida 0,04 mol dalam 15 ml tetrahidrofuran sedikit demi sedikit sampai habis. Kemudian campuran direfluks di atas penangas air selama 4 jam. Jika reaksi dianggap telah selesai, campuran dicuci dengan 100 ml air sebanyak dua kali, kemudian disaring dengan corong Buchner. Proses rekristalisasi dilakukan dengan menggunakan etanol panas. Kristal yang terbentuk disaring dengan corong Buchner, dicuci dengan etanol 10 ml sebanyak dua kali. Kristal dikeringkan dalam oven pada suhu  $60^\circ\text{C}^{(5)}$ .

#### Metode uji sitotoksik secara in vitro

Kultur sel HeLa sejumlah  $7 \times 10^3$  sel/well diinokulasikan ke dalam *microplate* 96 well plate dan diinkubasi dalam inkubator  $\text{CO}_2$ . Hari kedua dilakukan penambahan sampel yang dilarutkan dalam pelarut DMSO (dimetil sulfoksida). Sampel dengan konsentrasi beragam diencerkan dengan penambahan PBS (*phosphoric buffer solution*) dengan pH (7,30-7,65) ditambahkan ke dalam sel dalam *microplate* lalu dikocok dan disimpan kembali dalam inkubator  $\text{CO}_2$ . Setelah 48 jam, ke dalam sel ditambahkan reagen MTT dan diinkubasi selama 4 jam untuk selanjutnya ditambahkan SDS dan dikocok dengan baik. Inkubasi sel dilanjutkan kembali selama 24 jam. Perubahan warna dari MTT kuning menjadi formazan ungu di dalam mitokondria sel yang masih hidup dapat dikuantifikasi pada panjang gelombang  $\lambda=550$  nm dengan *Microplate reader*. Nilai  $\text{IC}_{50}$  dilihat dari grafik hubungan antara konsentrasi senyawa bahan uji ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ ) dengan intensitas larutan dari viabilitas sel $^{(7)}$ .

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Sintesis senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea

Skema sintesis senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea dapat dilihat

pada Gambar 2. Dari reaksi tersebut dihasilkan rendemen sebesar 49,7%. Uji kemurnian produk hasil sintesis dengan *meltemp electrothermal* didapatkan jarak lebur kurang dari  $2^\circ\text{C}$  yaitu sebesar  $51 - 52^\circ\text{C}$ . Uji kemurnian dengan metode KLT menggunakan tiga komposisi eluen dengan polaritas yang berbeda dihasilkan noda tunggal.

Konfirmasi struktur 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea dengan menggunakan spektrum UV terlihat bahwa terbentuk dua puncak pada  $\lambda_{\text{maks}}$  204 nm dan 222 nm. Absorbansi pada  $\lambda$  222 nm dikarenakan adanya ikatan rangkap terkonjugasi dari cincin aromatis. Pada spektrum IR terlihat adanya pita serapan pada  $3320\text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan adanya gugus  $-\text{NH}$ ;  $1700\text{ cm}^{-1}$  dan  $1646\text{ cm}^{-1}$  menunjukkan adanya dua gugus karbonil  $-\text{C}=\text{O}$ ;  $1531\text{ cm}^{-1}$  menunjukkan adanya  $-\text{C}=\text{C}-$  aromatis. Terbentuknya dua pita serapan gugus karbonil  $-\text{C}=\text{O}$  menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis terbentuk, karena senyawa asal hanya memiliki satu gugus karbonil  $-\text{C}=\text{O}$ .

Dari spektrum  $^1\text{H-NMR}$  terlihat dua puncak singlet pada 2,89 ppm dan 3,14 ppm yang berasal dari atom H dua gugus metil. Puncak pada 7,22 - 7,46 berasal dari atom H cincin aromatis, dan puncak pada 8,92 ppm berasal dari atom H gugus  $-\text{NH}$ . Dari spektrum  $^{13}\text{C-NMR}$  dapat dilihat dua puncak pada pergeseran kimia 27,18 ppm dan 35,72 ppm yang berasal dari dua atom C gugus metil. Cincin aromatis memberikan enam puncak yaitu pada 124,62 ppm; 127,89 ppm; 130,15 ppm; 130,89 ppm; 134,92 ppm dan 137,78 ppm. Dua puncak pada pergeseran kimia 155,63 ppm dan 172,99 ppm berasal dari dua atom C gugus karbonil  $-\text{C}=\text{O}$ .


#### 2. Uji sitotoksik in vitro

Metode yang digunakan dalam uji aktivitas sitotoksik adalah metode MTT. Prinsip dari metode MTT adalah terjadinya reduksi garam kuning tetrazolium MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromida) oleh sistem reduktase. Suksinat tetrazolium yang termasuk dalam rantai respirasi dalam mitokondria sel-sel yang hidup membentuk kristal formazan berwarna ungu dan tidak larut air. Penambahan reagen stopper (bersifat detergenik) akan melarutkan kristal berwarna ini yang kemudian diukur absorbansinya menggunakan ELISA reader. Intensitas warna ungu yang terbentuk proporsional dengan jumlah sel hidup. Sehingga jika intensitas warna ungu semakin besar, maka berarti jumlah sel hidup semakin banyak. Hasil uji sitotoksik senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea dapat dilihat pada tabel 1.


Berdasarkan nilai  $\text{IC}_{50}$  pada tabel 1, dapat disimpulkan senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea memiliki aktivitas sitotoksik yang lebih besar dibandingkan dengan obat kanker yang telah beredar yaitu hidroksiurea.

**Tabel 1** Hasil uji sitotoksik senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea terhadap sel HeLa


No.	Senyawa	IC <sub>50</sub> (µg/ml)
1.	1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea	223,87
2.	Hidroksiurea	479,02



**Gambar 1.** Struktur senyawa (a) urea, (b) hidroksiurea, (c) tiourea (d) 1-(benzoyloksi)urea, (e) fenilurea



**Gambar 2.** Skema sintesis senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea



**Gambar 3.** Ikatan hidrogen antara 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea dengan asam amino Cys 87 reseptor 2YWP

### 3. *Molecular docking* senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea

Proses *docking* senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea dilakukan terhadap reseptor Chk1 menggunakan program MVD. Dari proses *docking* ligan terhadap reseptor didapatkan data bahwa gugus amin dari senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea berikatan hidrogen dengan

asam amino Cys 87. Ikatan Hidrogen yang ditandai dengan garis putus-putus dapat dilihat pada Gambar 3. Nilai *Rerank Score* dari senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea yaitu -64,1151 dan hidroksiurea sebesar -39,0396. Nilai *Rerank Score* menggambarkan kestabilan ikatan ligan dan reseptor. Semakin kecil nilai *Rerank Score* maka semakin stabil ikatan obat reseptor. Dari data *Rerank Score*

dapat disimpulkan bahwa ikatan antara senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea dengan reseptor lebih stabil dibandingkan ikatan hidroksiurea dengan reseptor. Sehingga, dapat diprediksi bahwa senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea memiliki aktivitas sitotoksik yang lebih baik dibandingkan hidroksiurea. Hasil prediksi *molecular docking* ini sesuai dengan hasil uji sitotoksik senyawa yang dapat dilihat dari nilai  $IC_{50}$ .

#### KESIMPULAN

Senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea dapat disintesis melalui reaksi asilasi antara 1,3-dimetilurea dan 3-klorobenzoil klorida, dan diperoleh rendemen sebesar 49,7%. Senyawa 1-(3-klorobenzoil)-1,3-dimetilurea ( $IC_{50} = 223,87 \mu\text{g/ml}$ ) memiliki aktivitas sitotoksik yang lebih besar dibandingkan dengan obat kanker yang telah beredar yaitu hidroksiurea ( $IC_{50} = 479,02 \mu\text{g/ml}$ ). Senyawa ini dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga didapatkan senyawa antikanker baru dengan efek sitotoksik yang lebih baik.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk Laboratorium Kimia Medisinal Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang memfasilitasi penelitian ini dan Prof. Siswandono yang menyediakan lisensi program MYD.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Riskesdas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2007

2. Cancer Facts & Figures, American Cancer Society, 2012
3. Song, D.Q., Du, N.N., Wang, Y.M., He, W.Y., Jiang, E.Z., Cheng, S.X., Wang, Y.X., Li, Y.H., Wang, Y.P., Li, X., Jiang, J.D., Synthesis and activity evaluation of phenylurea derivatives as potent antitumor agents, *Bioorganic & Medicinal Chemistry*, 2009, 17:3873-3878
4. Saeed, S., Rashid, N., Jones, P.G., Ali, M., Hussain, R., Synthesis, characterization and biological evaluation of some thiourea derivatives bearing benzothiazole moiety as potential antimicrobial and anticancer agents, *European Journal of Medicinal Chemistry*, 2010, 45:1323-1331
5. Hardjono, S., Modifikasi Struktur 1-(benzoiloksi)urea dan Hubungan Kuantitatif Struktur Aktivitas sitotoksiknya. Disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2012
6. Clayden, Greeves, Warren & Wothers, *Organic Chemistry*, Oxford University Press, New York, 2001, 279-303
7. Gil, M.J., Maffi, M.A., Arteaga, C., Migliaccio, M., Encfo, I., Gonzalez, A., Merino, V.M., Synthesis and Cytotoxic Activity of N-(2-pyridylsulfenyl)urea Derivatives, a New Class of Potential Antineoplastic Agents, *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*, 1999, 9: 2321-2324