

*e-Journal*

# PustakaKesehatan

Volume 6 Nomor 1, Januari 2018

---



## Articles

- [Pengembangan Sensor Kloramfenikol Berbasis Bovine Serum Albumin menggunakan Spektrofotometri UV \(The Development of Chloramphenicol Sensor Based on Bovine Serum Albumin using Spectrophotometry UV\)](#)  
Sarah Aisha, Bambang Kuswandi, Dwi Koko Pratoko  
1-4 ([PDF](#))
- [Sintesis dan Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa N-Fenil-3,4-Diklorobenzamida \(Synthesis and Antibacterial Activity Assay of N-Phenyl-3,4-Dichlorobenzamide\)](#)  
Vinastika Gita Yualanda, Indah Purnama Sary, Dian Agung Pangaribowo  
5-10 [PDF](#)
- [Optimasi Propilen Glikol dan Etanol sebagai Peningkat Penetrasi Ibuprofen dalam Sediaan Gel dengan Metode Simplex Lattice Design \(Propylene Glycol and Ethanol Optimization as Ibuprofen Penetration Enhancer in Gel Dosage using Simplex Lattice Design Metho\)](#)  
Baiq Wahyudyati Karnia Qisti, Dwi Nurahmanto, Viddy Agustian Rosyidi  
11-17 [PDF](#)
- [Hidrolisis Protein Isolat Biji Melinjo \(Gnetum gnemon L.\) menggunakan Alkalase Terimobilisasi dan Aktivasnya sebagai Antihipertensi \(Hydrolysis of Melinjo Seed \(Gnetum gnemon L.\) Isolated-Protein using Immobilized Alcalase and Its Activity as Antihyper\)](#)  
Nur Fauziah Matra, Endah Puspitasari, Tri Agus Siswoyo  
18-24 [PDF](#)
- [Hubungan antara Profilaksis Kotrimoksazol dan Prevalensi Toksoplasmosis pada Pasien HIV Positif di Jember \(The Association Between Prophylactic Cotrimoxazole and the Prevalence Toxoplasmosis in HIV-Positive Patients in Jember\)](#)  
Elly Febry Taufany, Afifah Machlaurin, Prihwanto Budi Subagijo  
25-30 [PDF](#)
- [Optimasi Konsentrasi Span 80 dan Lama Pengadukan dalam Preparasi Microspheres Metformin Hidroklorida-kitosan \(Optimization of Span 80 Concentration and Stiring Time on The Preparation of Metformin Hydrochloride-Chitosan Microspheres \)](#)  
Christyn Novita S, Lusia Oktora Ruma Kumala Sari, Eka Deddy Irawan  
31-37 [PDF](#)
- [Hiperurisemia Pada Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Arjasa Kabupaten Situbondo Hyperuricemia in Adolescents \(16-24 Years Old\) in Arjasa Primary Health Center, Situbondo Regency](#)  
Yunus Ariyanto, Andrei Ramani  
38-45 [pdf](#)
- [Gambaran Kondisi Ibu Hamil dengan Diabetes Mellitus di RSD dr. Soebandi Jember Tahun 2013-2017 \(Description of Pregnant Women Condition with Diabetes Mellitus in RSD dr. Soebandi Jember on 2013-2017\)](#)  
Meggeria Dyah Matrika Tito Putri, Pudjo Wahjudi, Irma Prasetyowati  
46-52 [pdf](#)
- [Efektivitas Media Promosi “Piring Makanku” Pedoman Gizi Seimbang Sebagai Panduan Sekali Makan \(The Effectiveness of Media promotion "Piring Makanku" Balanced Nutrition Guidelines as a Guide Once Packed\)](#)

- [Status Gizi dan Kualitas Hidup Lansia yang Tinggal Bersama Keluarga dan pelayanan Sosial Tresna werdha \(Nutritional Status and Quality of Life of Elderly People Who's Lived With Family and Tresna Werdha Social Service in Bondowoso\)](#)  
Putri Istik Lailiyah, Ninna Rohmawati, Sulistiyani Sulistiyani  
60-67 [pdf](#)
- [Kajian Keputusan Badan Usaha terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Jember \(Corporations Decision on the Involvement in National Health Insurance in Jember\)](#)  
Galih Dwi Damaiyanti, Eri Witcahyo, Ragil Ismi Hartanti  
68-76 [pdf](#)
- [Praktik Higiene Personal dan Keberadaan Bakteri Escherichia coli Pada Tangan Penjual Petis \(Studi di Pasar Anom Kecamatan Sumenep Kabupaten Sumenep\) Personal Hygiene Practice and Existence of Escherichia coli Bacteria In Fish Paste Seller's Hand \(Study in](#)  
Yuli Rukmi Hasanah, Ellyke Ellyke, Prehatin Trirahayu Ningrum  
77-84 [pdf](#)
- [Uji Efektivitas Beras Herbal Forte terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 \(Study of the Herbal Rice Forte Effectiveness on Decreasing Blood Glucose of Diabetes Mellitus Type 2 Patient\)](#)  
Ancah Caesarina Novi Marchianti, Ali Santosa  
85-91 [PDF](#)
- [Kadar IL-10 Mencit Balb/C Terinfeksi Plasmodium berghei dengan Pemberian Fraksi Metanol Bangle \(Zingiber cassumunar Roxb.\) sebagai Terapi Komplementer \(The IL-10 level of Plasmodium berghei-infected Balb/C Mice after Methanolic Fraction of Bangle \(Zingib](#)  
Asis Fitriana, Bagus Hermansyah, Muhammad Afiful Jauhani, Wiwien Sugih Utami  
92-96 [PDF](#)
- [Hubungan Prostate Volume dan Intravesical Prostatic Protrusion terhadap International Prostate Symptom Score pada Pasien Benign Prostate Hyperplasia \(Relationship between Prostate Volume and Intravesical Prostatic Protrusion and International Prostate](#)  
Rahma Illa Putri Utami, Septa Surya Wahyudi, Yuli Hermansyah  
97-101 [PDF](#)
- [Perbandingan Luas Permukaan Telapak Tangan terhadap Luas Permukaan Tubuh berdasar Jenis Kelamin dan Indeks Massa Tubuh pada Dewasa Muda \(Comparison of Hand Surface Area on Body Surface Area based on Sex and Body Mass Index in Young Adults \)](#)  
Fatmalia Fhierziandrini Nuzuliana, Ulfa Elfiah, Sheila Rachmania  
102-106 [PDF](#)
- [Efektivitas Kombinasi Vankomisin dan Vitamin C terhadap Pertumbuhan MRSA \(Methicillin Resistant Staphylococcus aureus\) \(Effectiveness of Vancomycin and Vitamin C Combination on MRSA \(Methicillin Resistant Staphylococcus aureus\) Growth\)](#)  
Ulin Nuha Jazmin, Dini Agustina, Rony Prasetyo  
107-112 [PDF](#)

- [Hubungan Kadar SGOT dengan Kadar Leukosit pada Pasien NSTEMI di ICCU RSD dr. Soebandi Jember \(Correlation between SGOT Level and Leukocytes in NSTEMI Patients at ICCU dr. Soebandi Hospital, Jember\)](#)  
Finty Arfian, Suryono Suryono, Rini Riyanti  
113-117 [PDF](#)
- [Terapi Suportif Meningkatkan Motivasi untuk Melakukan Operasi Katarak pada Pasien Katarak di Wilayah Kerja Puskesmas Tempurejo Kabupaten Jember \(Supportive Therapy to Increase Motivation to Undergo Cataract Surgery on Patients with Cataract in the Area of Siswoyo Siswoyo, Murtaqib Murtaqib, Tri Buana Ratna Sari\)](#)  
Siswoyo Siswoyo, Murtaqib Murtaqib, Tri Buana Ratna Sari  
118 - 124 [PDF](#)
- [Hubungan Gaya Pengasuhan dan Struktur Kekuatan Keluarga dengan Risiko Penyalahgunaan NAPZA: Alkohol pada Remaja di SMA Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember \(Relationship between Parenting Style, Family Power Structure and Risk of Drug Abuse: Alcohol in Adol\)](#)  
Lina Nur Khumairoh, Latifa Aini Susumaningrum, Mulia Hakam  
125 - 132
- [Pengaruh Diabetes Self Management Education and Support \(DSME/S\) terhadap Diabetes Distress pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di RSD dr. Soebandi Jember \(The Effect of Diabetes Self Management Education and Support \[DSME/S\] on Diabetes Distress in Patie\)](#)  
Novita Nurkamilah, Rondhianto Rondhianto, Nur Widayati  
133 - 140 [PDF](#)
- [Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode Brainstorming dan Video terhadap Pengetahuan tentang Demam Berdarah pada Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Puger Kabupaten Jember \(The effect of Health Education Brainstorming Method and Video to the Knowledge about\)](#)  
Mukhammad Syafi`udin, Wantiyah Wantiyah, Kushariyadi Kushariyadi  
141 - 146 [PDF](#)
- [Perbedaan Kepuasan Perawat dalam Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Berbasis Komputerisasi dan Manual \(Studi di RS Paru dan RS Baladhika Husada Kabupaten Jember\) \(The Different of Nursing Satisfaction by Computerized Nursing Documentation and Manual Nurs\)](#)  
Yunita Selly Santoso, Dodi Wijaya, Retno Purwandari  
147 - 152 [PDF](#)
- [Perbedaan Dukungan Nenek dalam Keluarga Extended Family pada Pemberian ASI Eksklusif dan Tidak Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Arjasa Kabupaten Jember \(The Differences of Grandmother Support in Extended Family on Exclusive and Non-Exclusive Breastfee\)](#)  
Dina Amalia, Ratna Sari Hardiani, Lantin Sulistyorini  
153 - 160 [PDF](#)
- [EFEKTIVITAS EKSTRAK BUNGA KAMBOJA PUTIH \(Plumeria alba. L\) SEBAGAI DENTURE CLEANSER TERHADAP PERTUMBUHAN Candida albicans PADA BAHAN BASIS GIGI TIRUAN NILON TERMOPLASTIK \(Valplast\) Effectiveness Of Cambodia White Flower Extract \(Plumeria alba L.\) As Dent](#)  
Fitriana Wadianur, Lusi Hidayati, Yani Corvianindya Rahayu  
161-166 [PDF](#)

# Digital Repository Universitas Jember

- [Hubungan Pengetahuan Kesehatan Gigi dan Mulut dengan Karies Gigi pada Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Tahun Akademik 2016/2017 \(Correlation of Oral Health Knowledge with Dental Caries in First Grade Dentistry Students of Jember\)](#)  
Galuh Cita Sari Rahtyanti, Hestieyonini Hadnyanawati, Erawati Wulandari  
167-172 [PDF](#)
- [Uji Sitotoksisitas Ekstrak Pektin Limbah Kulit Buah Kopi Robusta \(Coffea canephora\) pada Kultur Sel Fibroblas Pulpa Gigi Manusia \(Cytotoxicity Effect of Pectin Extract from Coffea Robusta \(Coffea canephora\) Fruit Peels on Human Dental Pulp Fibroblasts Cel\)](#)  
Kharishah Muslihah, Agus Sumono, Dwi Warna Aju Fatmawati  
173-178 [PDF](#)
- [Pengaruh Perendaman Nilon Termoplastik Dalam Berbagai Konsentrasi Ekstrak Bunga Cengkeh Terhadap Modulus Elastisitas \(The Effect of Thermoplastic Nylon Immersion In Various Concentration of Clove Flower Extract to the Modulus Elasticity\)](#)  
Rachel Priskila Louwrensya Warinussy, Dewi Kristiana, FX Ady Soesetijo  
179-185 [PDF](#)
- [Prevalensi dan Distribusi Penderita Geographic Tongue pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Angkatan 2014 – 2016 \(Prevalence and Distribution of Geographic Tongue in Faculty Of Dentistry University of Jember Class of 2014-2016\)](#)  
Pratita Ayu Pinasthika, Ayu Mashartini P, Ristya Widy E Y  
186-191 [PDF](#)
- [Daya Hambat Ekstrak Buah Delima Merah \(Punica granatum Linn\) terhadap Pertumbuhan Staphylococcus aureus \(The Inhibition of Red Pomegranate Fruit Extract \(Punica granatum Linn\) on The Growth of Staphylococcus aureus\)](#)  
Erlita Prestiandari, Sri Hernawati, Leni Rohma Dewi  
192-198 [PDF](#)



## Uji Sitotoksitas Ekstrak Pektin Limbah Kulit Buah Kopi Robusta (*Coffea canephora*) pada Kultur Sel Fibroblas Pulpa Gigi Manusia (*Cytotoxicity Effect of Pectin Extract from Coffea Robusta (Coffea canephora) Fruit Peels on Human Dental Pulp Fibroblasts Cell Culture*)

Kharishah Muslihah, Agus Sumono, Dwi Warna Aju Fatmawati  
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember  
Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Bumi Tega Boto Jember 68121  
e-mail : [kharishahmuslihah@gmail.com](mailto:kharishahmuslihah@gmail.com)

### Abstract

**Background:** Coffee has a by-product (waste product) that generated from coffee processing. Coffee fruit's peels contains active compound, that is pectin. Pectin has several benefits in health, as a regeneration of hard and soft tissue that can be applied in dentistry and pectin has the potential as an anti-cancer substance. Pectin as a biomaterial must have biocompatibility. Biocompatibility of the material can be tested by cytotoxicity test by MTT method on human dental pulp fibroblasts cell culture. **Objective:** To know the toxicity of extract pectin from coffee robusta fruit peels on human dental pulp fibroblasts cell culture. **Method:** This research is a experimental laboratory with post-test only control group design. Culture of fibroblast cells at the well was exposed by pectin extract for 24 hours, then each well was given MTT and incubated for 4 hours. The effects of cytotoxicity were measured by calculating cell viability (%). Data were analyzed using Probit test, One-way ANOVA followed by LSD. **Result:** Each group has a cell viability value above 50%. **Conclusion:** Extract pectin from Robusta coffee fruit peel's had no cytotoxic effect on human dental pulp fibroblsts cell culture

**Keywords:** coffe robusta fruit peels, cytotoxicity, human pulp fibroblst cell culture, pectin

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kulit buah kopi merupakan produk samping (limbah) yang dihasilkan dari proses pengolahan kopi. Kulit buah kopi mengandung senyawa aktif berupa pektin. Pektin mempunyai beberapa manfaat dibidang kesehatan, yaitu sebagai bahan regenerasi jaringan keras maupun lunak yang dapat diaplikasikan di bidang kedokteran gigi serta pektin mempunyai potensi sebagai zat anti kanker. Pektin sebagai biomaterial harus bersifat biokompatibel. Biokompatibilitas bahan dapat diuji melalui uji sitotoksitas dengan metode MTT pada kultur sel fibroblas pulpa gigi manusia. **Tujuan:** Untuk mengetahui toksisitas ekstrak pektin kulit buah kopi robusta pada kultur sel fibroblas pulpa gigi manusia. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian laboratoris dengan rancangan *post- test only control group design* . Kultur sel fibroblas pada sumuran dipapar dengan ekstrak pektin selama 24 jam, lalu tiap sumuran diberi MTT dan diinkubasi selama 4 jam. Efek sitotoksitas diukur dengan menghitung viabilitas sel (%). Data dianalisis menggunakan uji Probit, One-way ANOVA dilanjutkan LSD. **Hasil:** Setiap kelompok memiliki nilai viabilitas sel diatas 50%. **Kesimpulan:** Ekstrak pektin kulit buah kopi robusta tidak toksik terhadap kultur sel fibroblas pulpa gigi manusia.

**Kata kunci:** Kulit buah kopi, kultur sel fibroblas pulpa, pektin, sitotoksitas

## Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Produksi kopi dalam negeri selalu mengalami kenaikan tiap tahun, terhitung dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Semakin meningkatnya jumlah produksi kopi maka semakin tinggi pula produk samping yang dihasilkan. Proses pengolahan kopi akan menghasilkan limbah atau hasil samping yang berupa kulit buah kopi. Hingga saat ini kulit buah kopi belum banyak dimanfaatkan padahal kulit buah kopi mengandung senyawa aktif berupa pektin [1,2].

Pektin adalah suatu senyawa heteropolisakarida yang secara umum terdapat pada dinding sel primer tanaman. Senyawa pektin dapat berfungsi sebagai perekat antara dinding sel yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penelitian Varoni dkk (2012) pektin merupakan *biomaterial* yang memiliki potensi yang baik untuk regenerasi jaringan lunak maupun keras. Pektin juga mampu mempercepat penyembuhan luka yang lebih cepat yang diuji coba pada *pig skin* (Chansiripornchai dkk, 2005). Serta pektin memiliki daya antioksidan yang dapat mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif dalam tubuh sehingga dapat mencegah kerusakan sel dalam tubuh. Penelitian yang dilakukan Rizki dkk (2015) juga menyatakan bahwa ekstrak pektin kulit buah kakao mempunyai potensi aktivitas anti kanker [3,4,5,p16]

Sebagaimana penelitian telah menyebutkan bahwa pektin merupakan kandidat biomaterial yang mempunyai banyak keuntungan dan manfaat di bidang kedokteran, namun hingga saat ini belum ada penelitian tentang pengaruh pektin terhadap sel normal rongga mulut apakah bahan tersebut dapat diterima jaringan dan tidak bersifat toksik, untuk mengetahui biokompatibilitas tersebut dapat dilakukan dengan pemeriksaan *in vitro* yaitu uji sitotoksitas. Uji sitotoksitas bahan dapat dilihat dengan melakukan pengukuran terhadap viabilitas sel dalam kultur. Kultur sel yang digunakan adalah kultur sel fibroblas yang diambil dari pulpa gigi manusia [6].

Metode yang umum digunakan untuk uji sitotoksitas adalah dengan metode MTT assay. Uji MTT sangat sensitif untuk mengevaluasi viabilitas sel. Kelebihan MTT assay adalah valid dan relatif lebih cepat. Garam *methylthiazol tetrazolium* (MTT) akan direduksi oleh sel hidup menjadi endapan formazan berwarna ungu dan jumlahnya sebanding dengan jumlah sel hidup [7].

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang sitotoksitas ekstrak pektin kulit buah kopi robusta terhadap kultur sel fibroblas pulpa gigi manusia.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratoris dengan rancangan penelitian *the post only control group design*. Penelitian dilakukan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

Proses uji sitotoksitas yaitu sel fibroblas didistribusikan kedalam 24 sumuran. Tiap sumuran berisi sel fibroblas dan media kultur DMEM dengan kepadatan  $3 \times 10^4$  sel/ml sebanyak 250  $\mu$ l. kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37°C. Sel fibroblas diamati dibawah mikroskop inverted, jika sel sudah memenuhi lalu ditambahkan ekstrak pektin pada sumuran. Ekstrak pektin sebanyak 100  $\mu$ l dengan konsentrasi 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, 1.562 dan 0.781  $\mu$ g/ml dimasukkan pada setiap sumuran dan masing-masing konsentrasi sebanyak 3 sumuran. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam. Setelah diinkubasi ditambahkan reagen MTT sebanyak 5 mg/ml. Sel diinkubasi kembali selama 4 jam dalam inkubator CO2 5%, pada suhu 37°C.


Reaksi MTT dihentikan dengan *stopper reagent* (SDS 10% dalam 0.1 N HCL) dan diinkubasi dalam suhu ruang selama 24 jam. Absorbansi kemudian dibaca dengan menggunakan ELISA reader pada  $\lambda$  595 nm. Hasil yang diperoleh dinyatakan dalam *optical density* (OD). Hasil tersebut kemudian dikonversi ke dalam rumus persentase viabilitas sel. Hasil persen kehidupan sel (viabilitas) di masukkan dalam analisis probit untuk menghitung IC50

% Viabilitas Sel =

$$\frac{\text{Absorbansi tes} - \text{Absorbansi media}}{100\% \text{ Absorbansi sel} - \text{Absorbansi media}} \times 100$$

## Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata presentase kehidupan sel seperti pada tabel berikut ini.



Gambar 1. Histogram rata-rata viabilitas pada semua konsentrasi.

Semua konsentrasi memiliki nilai viabilitas yang melebihi 50%. Presentase viabilitas tertinggi pada konsentrasi 6.25 µl dan terendah ada konsentrasi 0.781 µl.

Data hasil rata-rata presentase viabilitas sel lalu di hitung *inhibition concentration (IC 50)* menggunakan analisis probit. Didapatkan hasil seperti pada tabel berikut

Tabel 1. Hasil IC 50 pada analisis probit

Probabilitas	Konsentrasi
0.5	0.00

Hasil analisis probit pada tabel 1 menunjukkan bahwa Nilai IC50 yang diperoleh sebesar 0,00 µg/ml, yang artinya tidak ada konsentrasi yang menghambat 50% kehidupan sel.

Data selanjutnya dilakukan uji normalitas Hasil uji normalitas menunjukkan 0.982, nilai  $p > 0.05$  yang artinya data tersebut terdistribusi normal, dilanjutkan dengan uji homogenitas varian *Levene test* dengan nilai signifikansi sebesar 0.672 ( $p > 0.05$ ) sehingga data tersebut homogen. Data yang terdistribusi normal dan homogen sehingga dilanjutkan uji parametrik One-way Anova.

Uji one way Anova yang telah diolah didapatkan hasil tingkat kemaknaan nilai signifikansi sebesar 0.042 ( $p < 0.05$ ) yang berarti terdapat perbedaan pada seluruh kelompok dalam penelitian. Uji statistik dilanjutkan dengan uji LSD, Konsentrasi 25 memiliki perbedaan bermakna dengan konsentrasi 1.562 dan 0.781, serta pada konsentrasi 6.25 berbeda bermakna dengan konsertasi 3.125, 1.562 dan 0.78.

## Pembahasan

Hasil penelitian uji sitotoksitas pada sel fibroblas pulpa gigi manusia terlihat bahwa rata-rata persen sel hidup (viabilitas) pada semua kelompok konsentrasi lebih dari 50%. Oleh karena itu ekstrak pektin limbah kulit buah kopi robusta dapat dikatakan tidak toksik berdasarkan parameter toksisitas (IC50), yang artinya suatu biomaterial dikatakan tidak toksik apabila presentase sel hidup setelah terpapar bahan lebih dari 50%[8].

Hal ini juga didukung dengan hasil perhitungan IC50 yang didapatkan yaitu sebesar 0,00 µg/ml. Nilai IC50 yaitu nilai untuk menunjukkan konsentrasi ekstrak pektin yang dapat menghambat hingga 50% kehidupan sel fibroblas pulpa manusia. Nilai 0,00 µg/ml menunjukkan bahwa tidak ada konsentrasi ekstrak pektin kulit buah kopi robusta yang memberikan efek penghambatan pada 50% pertumbuhan sel fibroblas pulpa gigi manusia. Hal ini sesuai dengan penelitian Chansiripornchai dkk (2005) yang menunjukkan bahwa polisakarida pektin yang berasal dari kulit durian bersifat biokompatibel dan tidak menunjukkan efek toksik pada jaringan tubuh. Pektin dari kulit durian tersebut justru berperan dalam mempercepat proses penyembuhan yang diuji coba pada *pig skin* [9].

Hasil uji LSD menunjukkan pada konsentrasi 25 µg/ml memiliki perbedaan signifikan dengan konsentrasi 1.562 µg/ml dan 0.781 µg/ml, konsentrasi 6.25 µg/ml berbeda signifikan dengan konsentrasi 3.125 µg/ml, 1.562 µg/ml dan 0.781 µg/ml dan konsentrasi yang lain tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Tidak ada perbedaan yang signifikan tersebut karena pektin merupakan bahan yang tidak toksik terhadap kultur sel fibroblas pulpa gigi manusia, sehingga meskipun sel fibroblas dipapar pektin dengan berbagai konsentrasi persentase kehidupan sel tetap tinggi yaitu diatas 50%. Ekstrak pektin dengan konsentrasi 6.25 µg/ml dan 25 µg/ml diduga merupakan konsentrasi efektif yang tidak menimbulkan efek toksik pada sel fibroblas pulpa manusia, terlihat dari jumlah sel hidup pada konsentrasi tersebut paling tinggi yaitu sebesar 93% dan 97%. Senyawa pektin memiliki aktivitas antioksidan. Antioksidan pada pektin dapat mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif dalam tubuh sehingga kerusakan sel dapat dicegah. Antioksidan dapat menghentikan proses perusakan sel dengan cara memberikan elektron kepada radikal bebas sehingga radikal bebas tidak mempunyai kemampuan mencuri elektron dari



sel dan DNA. Pencegahan kerusakan sel ini akan menyebabkan banyaknya jumlah sel hidup sehingga pada penelitian ini, jumlah sel fibroblas yang hidup setelah dipapar pektin jumlahnya cukup tinggi [4].

Pektin mempunyai potensi sebagai zat anti kanker, dengan kemampuannya yang dapat menghambat metastasis sel kanker kolon sesuai penelitian Rizki dkk (2015). Pektin sebagai zat anti kanker diduga berhubungan dengan peran galektin-3 pada sel kanker. Galektin-3 merupakan protein dalam sel yang berperan dalam berbagai fungsi seluler salah satunya yaitu proses proliferasi, diferensiasi serta galektin-3 terlibat dalam proses metastasis. Galektin-3 mengalami over ekspresi dan jumlahnya relatif lebih banyak pada sel kanker. Pektin sebagai zat anti kanker tersebut mampu menghambat fungsi galektin-3 pada sel kanker. Pektin menghambat fungsi galektin-3 dengan menghambat pengikatan galektin pada  $\beta$ -galaktoside permukaan sel kanker. Terhambatnya fungsi galektin-3, sehingga menyebabkan metastasis pada sel kanker juga terhambat. Pektin juga dapat memicu kematian sel melalui jalur apoptosis pada sel kanker, terhambatnya fungsi galektin-3 pada sel kanker memicu galektin-3 untuk mengaktifkan sinyal apoptosis pada mitokondria, selanjutnya mitokondria akan mengarahkan pelepasan sitokrom c yang diikuti dengan aktivasi caspase 3 sehingga menimbulkan apoptosis [10,11].

Sedangkan pada sel normal pektin tidak menghambat dan tidak mempengaruhi fungsi dari galektin-3 sehingga galektin-3 tetap dapat berperan secara normal dalam berbagai fungsi selulernya dan tidak adanya penghambatan fungsi galektin-3 pada sel normal sehingga galektin-3 tidak memicu apoptosis (kematian sel) pada sel normal. Adanya apoptosis (kematian sel) pada sel kanker menandakan bahwa pektin bersifat toksik pada sel kanker dan tidak bersifat toksik pada sel normal [12].

Pektin juga mempunyai efek sebagai anti inflamasi. Efek anti inflamasi pada pektin didasarkan pada pengaruh pektin terhadap aktivitas fungsional leukosit. Pektin dapat menurunkan jumlah neutrophil pada proses inflamasi. Pada jaringan dengan jumlah neutrophil yang lebih sedikit diduga dapat mempercepat penyembuhan luka. Hal ini disebabkan neutrophil menghasilkan enzim neutrophil proteasae elastasae dan proteinasae-3 yang mempunyai kemampuan memecah elastin dan matriks ekstra seluler. Gangguan pada matriks ekstra seluler dapat mengganggu perbaikan epitel dan

dapat menghambat proses penyembuhan luka. Sehingga diharapkan menurunnya jumlah sel neutrophil dapat mempercepat proses penyembuhan luka [15].

Viabilitas sel yang ditunjukkan dalam penelitian ini akibat pengaruh ekstrak pektin kulit buah kopi robusta menunjukkan tidak adanya efek toksik pada sel fibroblas pulpa manusia. Hal ini ditunjukkan dengan persentase viabilitas sel yang lebih dari 50%. Berdasarkan penjelasan beberapa peniliti, pektin diduga memiliki beberapa manfaat dibidang kesehatan yaitu memiliki aktivitas antioksidan serta anti inflamasi sehingga mampu menekan kematian sel. Diharapkan senyawa ini memiliki arti luas dibidang kesehatan dan digunakan untuk pengobatan beberapa penyakit umum.

### Simpulan dan Saran

Ekstrak pektin limbah kulit buah kopi robusta merupakan ekstrak yang tidak toksik terhadap kultur sel fibroblas pulpa manusia. Persentase sel hidup (viabilitas sel) paling tinggi pada konsentrasi 6.25  $\mu$ l. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui mekanisme viabilitas sel dan respon sel terhadap ekstrak pektin kulit buah kopi robusta menggunakan parameter yang lain. Perlu adanya penelitian lebih lanjut meliputi uji biokompatibilitas secara in vivo atau uji klinis untuk mengetahui efek pektin kulit buah kopi robusta secara lengkap.

### Daftar Pustaka

- [1] Kemenperin. 2013. Produksi Kopi Nusantara Ketiga Terbesar di Dunia. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6611/Produk-si-Kopi-Nusantara-Ketiga-Terbesar-Di-Dunia> [diakses tanggal 2 Januari 2017].
- [2] Dofir, M. 2016. Produksi Kopi Jatim Meningkatkan, Areal Bahan Terus Diperluas.p.1 <https://www.suarajatimpost.com/read/3473/20161215/144853/produksi-kopi-jatim-meningkat-areal-lahan-terus-diperluas/> [Diakses pada 28 Februari 2017]
- [3] Srivastava, Pranati and Rishabha, Malviya. 2011. Sources of pectin, extraction and it's application in pharmaceutical industry-An overview. *Indian Journal of Natural Products and Resources*. Vol.2 10-18

- [4] Hawach Venicia, Marie-Anne Boujaoude, and Roula M. Abdel-Massih. 2016. The Cytotoxic and Anti-proliferative Activity of High Molecular Weight Pectin and Modified Citrus Pectin. *Functional Foods in Health and Disease*; 6(9): 587-601
- [5] Sayuti, K, dan Yenrina, R. 2015. *Antioksidan, Alami dan Sintetik*. Padang : Andalas University Press. p.16
- [6] Emilda, Y., E. Budiparman, dan S. Kuntari. 2014. Uji toksisitas ekstrak bawang putih *Allium Sativum* terhadap kultur sel fibroblast. *Dental Journal*. 7: 215
- [7] Siregar. F., B. Hadijono. 2000. Uji Sitotoksitas Dengan MTT Esei. *Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Indonesia*. 7: 29-30
- [8] Rogero SO, Malmonge SM, Lugao AB, Ikeda TI, Miyamaru, I, Cruz AS. 2003. Biocompatibility Study of Polymeric Biomaterials. *J Arif Organs* 27(5): 424-427
- [9] Chansiripornchai P., C. Pramatwinai dan A.. Rungsipipat, 2005. The Efficiency of Poly-saccharide Gel Extra from Fruit-Hulls of Durian for Wound Healing in Pig Skin. *Acta Hort*. Vol. 5(3): 39
- [10] Rizki, K. P., W. Rochmah dan G. Nandan. 2015. Aktivitas Antikanker Pektin Kulit Buah Kakao Terhadap Jumlah Sel Goblet Kolon. *IJPST*. 2.(3): 81
- [11] Nangia-Makker, P., S. Nakahara., V. Hogan, dan A. Raz. 2007. Galectin-3 in apoptosis, a novel therapeutic target. *J Bioenerg Biomembr*. 39:79-83
- [12] Sathisha, U V, Smitha Jayaram, M. A. Harish Nayaka, Shylaja M. Dharmesh. 2007. Inhibition of galectin-3 mediated cellular interactions by pectic polysaccharides from dietary sources. *Glycoconj J Springer Science*. 24:497-507
- [13] Deters, A. M., K. Schro, dan A. Hensel. 2005. Kiwi Fruit (*Actinidia chinensis* L.) Polysaccharides Exert Stimulating Effects on Cell Proliferation via Enhanced Growth Factor Receptors, Energy Production, and Collagen Synthesis of Human Keratinocytes, Fibroblasts, and Skin Equivalents. - *Journal Of Cellular Physiology*. 202:720.
- [14] Deters, A., J. Zippel, N. Hellenbrand, D. Pappai, C. Possemeyer, dan A. Hensel. 2010. Aqueous extracts and polysaccharides from Marshmallow root (*Althea officinalis* L.): Cellular internalisation and stimulation of cell physiology of human epithelial cells in vitro. *Journal of Ethnopharmacology*. 127: 67
- [15] Markov, P.A., S. V. Popov., I. R. Nikitina., R. G. Ovodova, dan Y. S. Ovodov. 2010. Anti Inflammatory Activity of Pectins and Their Galacturonan Backbone. *Russian Journal of Bioorganic Chemistry*. 37(7): 819
- [16] Varoni, E. M., M. Iriti, dan L. Rimondini. 2012. Plant Products for Innovative Biomaterials in Dentistry. *Journal Coatings*: 182. [www.mdpi.com/journals/coatings](http://www.mdpi.com/journals/coatings) [ Diakses pada 10 Desember 2016)

